

數見不解。良可清嘆。例如去夏及說君之男孩。患瀉。經兒科三診六劑。則大瀉。日計二三十行。甚至飲食蕩棄。食果果夥。頭汗身熱。昏昏沉沉。勢急而難救。觀其方。知小兒果患瀉。且身有熱。以他曲麥芽陳皮枳實之攻消。輝元動磨石斛黃牛之清瀉。不知該發肌表證乎。黃色薄白。所傷乃寒濕。藥病相悖。攻消殺伐。脾胃大瀉。無怪大瀉而特瀉。完穀為瀉。濕矣。與說君酌以煨姜朴花。溫散寒濕。肉蔻止草。緩發脾陽。一劑知。二劑癒。繼以桃花粥以開胃。則止瀉。調羹得差。又王姓友之男孩。始則原屬傷食。身熱、神暗、吐瀉。兒科用清熱消食。藥固中病。漸告痊可。煮泥僅曲麥芽。為治小兒病之無土妙品。善後之方。仍不脫調曲麥芽。再而再。則復瀉瀉無度。不惜藥債。反責食傷。神曲麥芽。再而再。(曾告戚王友兒因余非兒科專家示之信)伏維衞道。還是集曲麥芽。嗟夫。是兒之夭。雖之咎歟。豈不冤而不究而哉。竊思吾為將來之國家主人翁。所負將來之使命極大。莫非醫者憫其將來勞於國事之使命。不如預送入水陸宮。為安旦晷也乎。夫用藥如用兵。兵凶戰危。國事而儒。醫者何懼不然而乎。衷之兒科有陸科之名。臨

本報特聘羅家衡大律師為常年法律顧問
徐元誥大律師為常年法律顧問
事務所：北京師大六十四號
電話：中央八九四六號

風疹塊淺說

(秦丙乙)

備。價不甚貴。服法先以溫開水調服。約每盒四分之數。用棉捲蘸水調服。越數分鐘。即大聲喝。去毒氣。再服。則毒氣底消。每日服三次。每次服二藥。忌熱食。可安。重則另服中藥。忌熱食。一日。即萬無一失。此法得授。已救活四十餘人矣。(中藥方) 浮萍草三錢。肥兒子三錢。五楮梗三錢。細川連三錢。元明粉二錢。沖服。蒲公連三錢。生山梔四錢。生甘草三錢。山豆根四錢。連翹壳四錢。香薷葉四錢。金銀花五錢。生大黃五錢。熟大豆八錢。馬料豆八錢。綠豆壳八錢。川升水二升。麻油兩盞各四兩。煎滾清飲。

此症初起。不可服寒涼藥強遏。雖伏伏一時。其害有不可勝言者。

此症之患者。官忌其所慮。若無所事。則症頗易愈。若念茲在茲。抓搔撫視。時刻存心。將愈多而愈痒。要之亦心選作用之關係耳。

此症色赤者多。色白者少。亦難得熱則劇。得寒稍減。白慘遇晴恆消。遇雨轉甚。此傳之古老。頗亦有驗者也。

吳淞特別市第一民衆教育館程肇伯君。前曾來函詢問。據述一切。大概亦屬本證。不至速成春溫。可參閱此篇。

作者註。

(五) 風驚與炎膜腦

(消癰) 黃症。壯熱。不惡寒。頭搖驚惕而現痛苦狀。咬牙。脣顫。手足抽搐。口內涎。而赤引餅。二便黃赤。昏迷譫語。項強。角弓反張。胸腹滿。千金龍膽瀉肝加減主之。

膽草二分、川連五分、黃芩八分、天麻二錢、莢製二錢、杭菊二錢、丹皮錢半、茜草二錢、生甘草八分、生石決八錢、鉤藤三錢、芍藥三錢、茯苓三錢、全瓜蒌三錢、

何) 加減法。舌黃乾結。加生地五錢。熱通兩器。加犀角屑羚羊片各四分。寒甚加竹瀝一兩枳實一錢。苦黃厚不大便。加生大黃元明粉各錢半。胸滿有停水。加赤猪苓各三錢。本通八分。熱壯無汗。加淡豆豉三錢。薄青一錢。甚者加麻黃六分。惟寒未罷。肢痛。加荆防各八分。兼寒三錢。手相失時冷者。再加桂枝六分。項強。手足掣動。角弓反張逆者。加龜尾五分。氣逆加西洋參一錢。濃濁色黃。加真貝一錢赤猪苓各三錢。色淡黃。不甚寒。防輔虛症。熱雖壯。舌光絳。爪色殷紅不活。此熱應津涸去膽草黃芩。連柏石決。虛症。大熱不退。唇裂出血。但氣促神昏。兩目無光。面色舌色乾枯不華。手足抽掣。頭搖睛紅。鼻孔頻動而面青舌反張。莊氏加陳酒中地黃湯主之。

本報主筆
楊志一
朱振聲
診例

(戊) 急病隨請隨到	(丁) 膏丸方四元	(丙) 出診四元	(乙) 門診一元	(甲) 特製二元
	大日取件	路遠遞加	貧病減半	隨到隨診
時以 後	四時止	至下午	門診上 九時	時間
一第	藥里第	南路會	上海會	診所
三九	四四	五六	三六	隔

掛號處啓

幸福報

弘儀署

期 一 一 二 第

(日三月五年九十國民)
▲ 分 一 洋 售 份 每 ▲

館址上海三馬路雲南路
每計元之開 每五五年內國土

廣生
期每
計五
元均
之勞
如排
中長
定規
三三
個日
二個
本元
外元
見九

格(寸)於新
期面入

五共新聞五共 日 張全在釋票

一件好消息

目錄
 虛勞病綱要(中)王仁
 兒科宜注重虛虛之誠
 風疹塊淺說(秦丙乙
 百病指南張治河
 服脫炎與蕁風(何雲龍

經驗良方

六一散……………仲圭撰

治瀉肉方……………(前人)

治白喉方……………(前人)

強身助力丸……………(前人)

急救誤吞自來火方(前人)

軍醫生活記……………(余不平)

本報爲方便讀者檢閱起見。自第一期起至百期止。特編總目錄一份。每份只售銅元十枚。讀者幸速購置。

(主一仁)

陰虛 陰虛亦由精氣虧損。而肝腎爲之主。肝主藏血。腎主藏精。精血消耗。則精枯髓竭。君相火炎。而成陰虛。以肝腎皆陰藏也。亦有腎中真陰虛者。蓋腎精勞傷精。即指此。

。經閉骨痛

經曰。陰虛生內熱。凡怔忡盜汗。衄血吐衄。遺精崩漏。經閉骨蒸。皆陰虛之症。脈見數而無力。陰虛則弱。內熱則數也。腎陰虛者。兼見頰赤唇紅。五心煩熱。口乾不

而不復。則

用藥 宜甘潤之品。河車大造丸。固本湯。並主之。腎陰虛者。則當以補水。六味丸。左歸飲主之。久不復者。宜參多五味子。杏仁。川貝。蘇地。烏髮膠。燕窩。烏骨雞。阿膠。秋石。紫河車。龜膠。白蜜之屬大劑與之。

青年一
切疾苦
之慈航

青年男
女慾海
之明燈

之女青
明陰年
燈海男
 之切青
慈庚年
航苦
 班一舉零客內書本
 ▲▲脫陽早汗滑遺
陰陽痿泄精補精
傷愈自來防補遺
寒救癆子止效免治
方法法法方法法法
 ▲▲橫下防女久久急
橫下防女久久急
內特日夢必除自辨
消效濁免止橫治
法藥法方方方法
 ▲▲遺精玉趾楊梅瘡
遺精玉趾楊梅瘡
風球臃腫便毒收結
驗驗癰疽刺瘡便毒
方方方法方方方法
 ▲▲雙少和心天可精膏
雙少和心天可精膏
效年氣烈然靠清膏
症耳痛如美惡得購
班其諸效病客子方
方方法法法術方術
 四角洋五定厚一全
大特圓價銀大三
 發報率南路三上
行館路雲馬灘

(余不平)

甚麼地方去呢。要走又沒有目的地。走倒容易。萬一不得其所。又怎麼說法呢。只好定定心。再尋機會罷。那時吐易也。國美方處。有

(張治河)

便以水灌。既灌不醒。應盧扁不能圖矣」。先哲論病。多以六氣爲主觀。傷寒則認爲寒氣在內。中暑則認爲暑氣在內。今見辛涼之蘇汁。溫熱之薑土。貽念中暑之重症。乃想入幻境。曲爲解釋。曰熱因熱用。曰溫能除大熱也。殊不知。六氣傷人。純因人之體質而生反應。如充血體質。卽古人所說之火體。無論受寒受暑刺激皆起充血變化。(卽古人所說之熱象)。貧血體質。(卽古人所說之寒象)無論受寒受暑刺激。皆起貧血變化。(卽古人所說之寒象)。大抵寒此法而得生者。必係貧血體質之中熱發竭症也。此法主力。純在蘇汁。刺激嗅覺神經。使腸筋與胃。振盪之熱土。僅助性力耳。其他用水灌漬。而愈者。則又中熱性熱之症也。

(調攝中暑之人。務須臥於空氣新鮮清靜之所。避免一切煩勞。中熱性熱者。多與瓜果食之。中熱發竭者。與以姜棗蘇蒜爲君。惟薑厚油膩之品。務要禁絕。

霍亂

(病原)本症病原。爲食滯與細菌。或外受寒暑刺激。內因飲食雜進。腸胃運化失職。食物停滯於中。醱腐散敗。化生細菌。

本報集由第百卷奉報載全年材料裝訂而成每集共一百頁計三十萬言由全國數百位名醫選述內容所載完全切合實用無論內外婦幼花柳等症以及一切急自療方法莫不應有盡有得此一書小病能自行治療大病免藥石亂投稱之爲「康福保障」雖曰不宜每集實售大洋一元存書無多欲購從速

總發行所上海三馬路雲南路口幸福報館

虛之

凡小兒體態未久。其身體之一切構造。尚未完固。故發生疾病較易。知讀未開。無七情六慾之萌。故夢感冒、傷寒、傷食之病。小兒開始第一慾是食。父母之愛與縱。有相互關係。故傷食更夥也。風寒散之。瀉熱清之。食滯消之。固所習知也。然邪實宜攻邪。邪去即當順正。素問云。大毒治病。十去其六。有邪可攻。中病即止。過則傷正矣。壯年且宜謹。況嬌嫩之孩提乎。所以兒科家最宜注意虛處之誤也。奈何其泥成之兒科專家之不悟乎。見寒則羌活防風。見熱則不遑石膏。恨藥(世之兒科專家自備藥末以假病兒俗名拘藥)則山查麥芽。處方則焦糊雞膽。一診如是十診如是。前醫如是。更醫復如是。攻之。伐之。活剝剝地。將小性命送入枉死城中。方甘罷休。乃